

Quand doit-on suspecter une douleur neuropathique ?

ATTENTION : La douleur neuropathique peut être cachée par la douleur nociceptive

Dossier du patient

Questions au patient et à la famille

Âge = Facteur de Risque

Douleur exprimée verbalement ou par des troubles du comportement

Recherche des pathologies potentiellement responsables de DN

- DN périphériques :
 - Post-zostériennes
 - Diabétiques
 - Post-chimio/ post-radiothérapie
 - Cancer
 - Post-chirurgie
 - (Lombo)radiculalgie
 - Amputation
- DN centrales :
 - AVC
 - SEP
 - Traumatisme médullaire
 - Névralgie du trijumeau
 - Tumeur cérébrale
- DN associées à la douleur nociceptive
 - AOMI
 - Plaies et escarres
 - Cancer

Observation et examen clinique

- Recherche des signes suggérant la présence de DN
 - Cicatrice/lésion
 - Déficit sensori-moteur
 - Allodynie et hyperalgésie (durant la toilette)
- Description des caractéristiques de la douleur : brûlure, coup de couteau, démangeaisons, fulgurante
- Moyens de soulagement trouvés par le patient

ET/OU

ET/OU Echec des thérapeutiques classiques

Evaluation systématique de la DN